

# 1歳のお誕生日までに受ける予防接種

## ワクチンデビューは 2か月からです。



赤ちゃんのかかりつけ医に  
予防接種スケジュールを作ってもらいましょう。

1 ヒブ（インフルエンザ菌b型）

2 肺炎球菌ワクチン

どちらも乳幼児期の髄膜炎を予防します。生後6か月から髄膜炎がふえますからそれまでに3回接種を。

3 B型肝炎ワクチン

将来B型肝炎ウイルスによって肝炎、肝硬変、肝がんになることを防止します。

4 ロタウイルスワクチン

ロタウイルス胃腸炎の重症化を防ぐワクチンです。ごくまれに腸重積症の副作用がありますが生後2か月から始めると比較的安全です。生後6週で単独でやると他のワクチンのスケジュールがおくれますので生後2か月からの同時接種が原則です。

5 ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ4種混合ワクチン

0歳で百日咳にかかる危険です。生後3か月からできます。

6 BCG

結核の予防接種です。日本は他の先進国にくらべて結核の発生が多い国ですし、結核の髄膜炎は薬でなおすことがまだできません。

7 日本脳炎

3歳から始めるのが標準ですが、0歳児が日本脳炎にかかる例があり、豚の多い地域では6か月からの接種がよいでしょう。

8 インフルエンザ

生後6か月から接種が可能で、重症化の予防になると考えられています。

# 予防接種スケジュールモデル

1回目生後2か月から

ヒブ 肺炎球菌  
 ロタ B型肝炎★

4週

2回目生後3か月から

ヒブ 肺炎球菌  
 ロタ B型肝炎  
 4種混合

4週

3回目

ヒブ 肺炎球菌  
 (ロタ)注 4種混合

4週

4回目生後5か月から

4種混合  
 BCG

4週

5回目以降  
 生後6か月から

- B型肝炎
- ★の接種日から20週間後
- インフルエンザ2回(秋)
- 日本脳炎第1期2回(希望者)

## 予防接種の記録(1)

Immunization Record

感染症から子ども(自分の子どもはもちろん、周りの子どもたちも)を守るために、予防接種は非常に効果の高い手段の一つです。子どもたちの健康を守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、子どもに予防接種を受けさせましょう。

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
インフルエンザ (Hib) Haemophilus type b	1回			
	2回			
	3回			
追加				
小児肺炎球菌 Streptococcus pneumoniae	1回			
	2回			
	3回			
追加				
B型肝炎 Viral Hepatitis type B	1回			
	2回			
	3回			
追加				

● その他

## 予防接種の記録(2)

Diphtheria・Pertussis・Tetanus・Polio

時期	ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
第1期	1回				
第2期	2回				
第3期	3回				
第1期追加					

BCG

接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
麻疹 (はしか) Measles	第1期			
風疹 Rubella	第2期			

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
水痘 Varicella	1回			
	2回			

## 予防接種の記録(3)

日本脳炎  
Japanese Encephalitis

時期	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
第1期	1回			
第2期	2回			
第1期追加				

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
ヒトパピローマ ウイルス (HPV) Human Papilloma (2価・4価)	1回			
	2回			
	3回			

● 薬剤や食品などのアレルギー記入欄

## 予防接種の記録(4)

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
ジフテリア・破傷風 Diphtheria・ Tetanus	第2期			
日本脳炎 Japanese Encephalitis	第2期			

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
ロタウイルス Rotavirus				

ワクチンの種類 Vaccine	接種年月日 Y/M/D (年齢)	メーカー/ロット Manufacturer/ Lot.No.	接種者署名 Physician	備考 Remarks
おたふくかぜ Mumps				
インフルエンザ Influenza				

☆接種間隔が4週とは、4週間後の同じ曜日に接種できるということです。

☆(ロタ)注 5価ロタワクチン3回目。

☆これはひとつのモデルです。実際のスケジュールや順番はかかりつけ医と相談して決めてください。

☆ロタウイルスワクチン、インフルエンザワクチンは有料です。一部の市町村で補助制度があります。